

Note

Si raccomanda di iniziare il trattamento anti-HIV a chiunque abbia una conta dei CD4 inferiore a 350 e si senta pronto. In particolare, è raccomandato a tutti coloro che hanno una conta dei CD4 inferiore a 200.

Si consiglia di consultare il medico curante o un altro operatore sanitario di fiducia per saperne di più sul trattamento stesso e per capire se si è pronti ad affrontarlo.

Talvolta viene iniziato il trattamento quando la conta dei CD4 non è ancora scesa al di sotto di 350. È raccomandato per coloro che:

- accusano disturbi causati dall'HIV;
- presentano patologie concomitanti come epatite e diabete;
- sono ad alto rischio di malattia cardiovascolare;
- hanno più di 50 anni di età
- hanno una relazione con un partner sieronegativo (il trattamento riduce infatti il rischio di trasmissione del virus per via sessuale).

Per saperne di più


NAM è un'organizzazione di comunità per la lotta contro l'HIV con sede nel Regno Unito. Lavoriamo a stretto contatto con professionisti nel campo della medicina, della ricerca e dell'assistenza sociale, oltre che con persone direttamente colpite dall'HIV. Produciamo materiale informativo in lingua inglese per la distribuzione in versione cartacea o via web, destinato sia alle persone sieropositive che agli operatori che lavorano nel campo dell'HIV.

Questo materiale è basato su una pubblicazione originale NAM protetta da copyright. NAM non è responsabile dell'accuratezza della traduzione o della sua rilevanza a livello locale.

Siamo spiacenti, in quanto organizzazione di lingua inglese, di non poter intrattenere una corrispondenza in italiano. Sul nostro sito web aidsmap.com è però possibile consultare un database dei servizi HIV di tutto il mondo per trovare l'organizzazione o il servizio sanitario locale più vicino a voi.

Su aidsmap.com potrete inoltre trovare materiale tradotto da leggere o scaricare.

prime informazioni quando iniziare il trattamento?



NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
Regno Unito
Tel: +44 (0) 20 7840 0050
Fax: +44 (0) 20 7735 5351
Sito web: www.aidsmap.com
Email: info@nam.org.uk

Contenuti e grafica sovvenzionati dal NHS Pan-London HIV Prevention Programme e NHS South West Essex (Regno Unito).

Traduzione sovvenzionata da Merck, Sharp & Dohme.

Copyright® NAM 2010
Per tradurre, adattare o riprodurre questo documento si prega di contattarci.

Numero di registrazione nel Regno Unito: 1011220

NAM fornisce ogni anno materiale informativo a migliaia di persone a titolo completamente gratuito. Chi desiderasse fare una donazione, può visitare www.aidsmap.com/donate.


Le informazioni qui contenute riflettono le pratiche attualmente raccomandate per la cura e il trattamento dell'HIV in Europa.

Si ringrazia LILA per la traduzione di questa pubblicazione.




Non è detto che sia sempre necessario iniziare subito il trattamento anti-HIV. Dipende da quanto l'HIV ha già intaccato il sistema immunitario.


1 Il sistema immunitario è la naturale barriera difensiva dell'organismo. Quando è in salute, è sufficiente da solo a combattere infezioni e malattie.




2 La conta dei CD4 è un esame del sangue che ne verifica le condizioni. Un'alta conta dei CD4 è indice di un sistema immunitario in buona salute.




3 Una bassa conta dei CD4, invece, è segno che l'HIV ha indebolito il sistema immunitario.




4 Se la conta dei CD4 è inferiore a 350, si raccomanda in genere di iniziare il trattamento.



5 Il trattamento anti-HIV impone di assumere farmaci ogni giorno e a orari precisi. È un impegno gravoso, per il quale è necessario sentirsi pronti.



6 Il trattamento rinforzerà il sistema immunitario, riportandolo in condizione di proteggere l'organismo dalle aggressioni.



In primo piano

- Le linee guida europee raccomandano di iniziare il trattamento anti-HIV quando la conta dei CD4 scende al di sotto di 350.
- Il trattamento impedirà che il sistema immunitario subisca ulteriori danni e ridurrà il rischio di contrarre malattie in futuro.